

Les connaissances des Français sur le bon usage des

ANTALGÉSIQUES

#1 - Le paracétamol

Plus de **9 FRANÇAIS SUR 10** déclarent avoir déjà pris du paracétamol

Au cours des 12 derniers mois, les Français ont été...

31%

à en prendre au moins une fois par mois



15%

à en prendre chaque semaine

6%

à en prendre tous les jours


Un profil des utilisateurs de paracétamol similaire à celui de la population française :

Hommes **48%** Femmes **52%** Âge moyen **49 ANS**

Une prise de paracétamol assez autonome chez les Français

LE PLUS SOUVENT, lorsque les Français prennent du paracétamol :

33% utilisent un médicament de leur armoire à pharmacie sans recourir à la notice ou à une précédente ordonnance.




27% en achètent sans ordonnance à la pharmacie

32% suivent les recommandations d'une ordonnance ancienne ou actuelle

Lorsque la prise de paracétamol fait suite à une ordonnance :

13% ont demandé au médecin d'ajouter cette prescription sur l'ordonnance



Lorsque les Français ont du paracétamol dans l'armoire à pharmacie, près de **9 SUR 10** gardent la boîte **et** la notice.



Pendant la grossesse, en cas de douleur :

1 FEMME SUR 3 a pris ou prendrait du paracétamol en automédication



Près de **6 PARENTS SUR 10** déclarent avoir déjà donné du paracétamol à leur(s) enfant(s).

36% utilisent le plus souvent un médicament de leur armoire à pharmacie, sans recourir à la notice ou à une précédente ordonnance.


Les raisons de prendre du paracétamol

Au cours des 12 derniers mois :



Une connaissance imparfaite des médicaments contenant du paracétamol

Les 3 médicaments les plus connus des Français



Mais moins d'1 FRANÇAIS SUR 2 cite les médicaments sans ordonnance pour le rhume (Actifed®, Fervex®, Humex®) qui contiennent également du paracétamol.


Et moins d'1 FRANÇAIS SUR 5 cite Ixprim®, Lamaline®, Claradol®, Prontalgine®, Izalgi®, Klipal®, Dolko® ou encore Zaldiar®.

Une connaissance des bonnes pratiques d'automédication qui mérite d'être renforcée

Sur la dose maximale en une prise :

82% citent la bonne réponse (1g /prise)

MAIS 8% estiment possible de dépasser 1g lors d'une prise




Sur la dose maximale quotidienne en automédication :

52% savent qu'il ne faut pas dépasser 3g/ jour sans avis médical


17% estiment pouvoir dépasser 4g/ jour.

7% considèrent qu'il n'y a pas de dose maximale tant que la douleur persiste




Sur le délai à respecter entre 2 prises :

85% citent la bonne réponse (4 à 6 heures)



Sur le nombre de jours maximal de traitement en automédication :


78% citent la bonne réponse (5 jours)



Sur les conséquences d'un surdosage de paracétamol :

La **toxicité sur le foie** est la principale conséquence grave :

54% des Français en ont conscience



MAIS 10% estiment qu'il n'y a aucune conséquence.

Les informations au sujet de la toxicité sur le foie sont obtenues via :

La notice/boîte du médicament **40%**

Les médias grand public **37%**

Le médecin **29%**

Le pharmacien **18%**